

ทำอย่างไร ? เมื่อห่านพบคนชัก

ผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่มักหายจากการชักเมื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยบางคนภัยหลังการรักษา ก็ยังคงมีอาการชักอยู่ บุคคลที่อยู่ใกล้ตัวผู้ป่วยกลุ่มนี้มักรู้จักรุณามากกับอาการชักเป็นอย่างดีและคงไม่เป็นเรื่องยากที่จะรับมือแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยพบเห็นอาการชักมาก่อนอาจไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้ว่าจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร

เราจะเรียนรู้คร่าวๆเกี่ยวกับอาการชักความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นขณะชัก และการแก้ไขเบื้องต้น อาการชักมักเกิดขึ้นในรูปแบบคล้ายเดิมและหยุดได้ด้วยตัวเอง ขณะชักผู้ป่วยอาจมีอาการเกร็ง หรือ กระตุก บางส่วนของร่างกาย หรือ ทั่วทั้งตัว ที่เรียกว่า “ลมบ้าหมู”

บางคนอาจแค่เหม่อลอย ไม่ตอบสนอง กระพริบตาถี่ เคี้ยวปาก พูดชาลับสน หรือ มือคลำซ้ำของบางครั้งอาจมีลักษณะคล้ายสะดุงแล้วล้มไปขณะชักบางคนอาจร้องเลียบดัง หายใจแรงติดขัด และผิวหนังอาจเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ โดยเฉพาะกรณีชักเกร็งกระตุกทั้งตัว



เมื่อพบเหตุมีคนชักเกร็งกระตุกทั้งตัว

1. ควรพยายามกันคนไม่ให้มุ่งดู
2. ระวังไม่ให้คีรະษะผู้ป่วยกระแทก อาจหาเลือผ้ามารองใต้คีรະษะ
3. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากอยู่ในสถานที่อันตราย เช่น บนถนน หรือ บันได
4. ไม่ควรใส่สิ่งของใดๆในปาก เพราะอาจแตกหักและทำให้ลำลักได้
5. ไม่ควรยืด ดึงรั้งแขนขาผู้ป่วยขณะชักห้ามป้อนยา หรือใส่สิ่งของต่างๆเข้าปาก เพราะอาจเกิดการสำลักได้

หลังชักผู้ป่วยอาจเปลี่ยนไปทำคร...

1. พยายามพลิกตะแคงตัว
2. เช็ดน้ำลาย หรือ สิ่งที่อาจอุดกั้นการหายใจ เช่น พันปลอม หรือ เศษอาหาร อยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาจนกว่าผู้ป่วยจะรู้สึกตัวดี
- 3.