



# ผลข้างเคียงของยากันชัก

ชื่อสามัญของยา	ผลข้างเคียงที่พบบ่อย	ผลข้างเคียงที่พบไม่บ่อยแต่อาจรุนแรง
Phenytoin	ตากระตุก (nystagmus) เวียนศีรษะ เห็นภาพซ้อน ชิม เตินเซ คลื่นไส้ อาเจียน เหงือกบวม หน้าหยาบ มีขนเยอะ (hirsutism) ลิ่วเพิ่มขึ้น	ผื่น (Steven-Johnson syndrome) ตับอักเสบ แคลเซียมต่ำ ไข้ ต่อมน้ำเหลืองโตทั่วไป เส้นประสาทอักเสบ เม็ดเลือดแดงผิดปกติ (folate deficiency)
Phenobarbital	<b>เด็ก</b> - ชุกชนไม่อยู่สุข ก้าวร้าว พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง <b>ผู้ใหญ่</b> - ง่วงซึม อ่อนเพลีย เครียด บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง	ผื่น (Steven-Johnson syndrome)
Sodium valproate	มือสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ผมรั่ว มีแอมโมเนียสูง (hyperammonemia) น้ำหนักเพิ่ม	ตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ
Carbamazepine	คลื่นไส้ ชิม เตินเซ เห็นภาพซ้อน	ผื่น (Steven-Johnson syndrome) การควบคุมเกลือแร่ผิดปกติ (SIADH) ไขกระดูกผิดปกติ (Aplastic anemia) ตับอักเสบ เม็ดเลือดขาวต่ำ
Topiramate	มีนงง เตินเซ ความคิดเชื่องช้า ความผิดปกติทางการพูด น้ำหนักลด	นิ้วในไต ต้อหิน เหงื่อออกน้อย
Lamotrigine	มีนงง เห็นภาพซ้อน เตินเซ	ผื่น (Steven-Johnson syndrome)
Levetiracetam	ชิม มีนงง	มักไม่ค่อยมี
Gabapentin	ง่วงนอน ชิม เวียนศีรษะ	มักไม่ค่อยมี
Vigabatrin	มีนงง ง่วงซึม	ความผิดปกติทางลานสายตา

ข้อมูลจาก: แนวทางการรักษาโรคลมชัก สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย



จัดทำโดย  
หน่วยประสาทวิทยาในเด็ก  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนโดย

